

TOALETY PUBLICZNE

Wszystkie powierzchnie w toaletach, które mogły mieć kontakt z wydzielinami oddechowymi, moczem lub kałem powinny być zdezynfekowane zgodnie ze standardowymi procedurami kontroli infekcji oraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi użycia danego środka dezynfekcyjnego. Kiedy aktywność wirusa grypy jest wysoka, należy zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji toalet oraz często dotykanych powierzchni w obszarach publicznych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

- ▲ Co najmniej trzy razy dziennie z codzienną dezynfekcją punktów dotyku, jeśli toalety są często używane.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

- ▲ Podczas mycia zakładaj rękawiczki jednorazowe. Wyrzuć rękawiczki po użyciu.
- ▲ Myj ręce często, przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, używając mydła i wody i/lub środka od odkażania rąk na bazie alkoholu.

PROCEDURA

1. Przeczytaj uważnie i stosuj się do zaleceń na etykiecie środka dezynfekującego.
2. Jeśli powierzchnia jest widocznie zabrudzona, należy umyć ją i wypłukać przez dezynfekcją. Myj z góry na dół.
3. Dokładnie zmocz powierzchnię zarejestrowanym¹ środkiem dezynfekującym. Powierzchnia powinna pozostać zwilżona zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.
4. Przetrzyj powierzchnie często dotykane, takie jak włączniki światła i wentylacji, krany, uchwyty do splukiwania wody, klamki i poręcze, przy pomocy zarejestrowanego środka dezynfekującego zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na etykiecie.
5. Skontaktuj się z przedstawicielem Ecolab w razie zapotrzebowania na bardziej sprecyzowane procedury.

¹ Na przykład zarejestrowane w Polsce produkty Ecolab zgodnie z lokalnymi przepisami.